

WISSENSWERTES RUND UM DIE FOHLENGEBURT

01

VOR DER GEBURT IMPFFSTATUS DER STUTE PRÜFEN

- Tetanus: alle 2 Jahre
- Influenza empfohlen: im 4.-5. und 10.-11. Trächtigkeitsmonat
- Herpes: 5., 7. und 9. Trächtigkeitsmonat

ENTWURMUNG DER STUTE

- Entwurmung nach spezifischen Betriebsanforderungen während der Trächtigkeit
- Wichtig: Entwurmung im letzten Trächtigkeitsmonat



Physiologische Trächtigkeitsdauer der Stute: 320-360 Tage

VORBEREITUNG AUF DIE GEBURT

- Rechtzeitig vor dem Geburtstzeitpunkt: Einstellung in Abfohlbox (groß und sauber)

ANZEICHEN DER NAHENDEN GEBURT

- Aufeutern (2-4 Wochen vor der Geburt)
- Bildung von Harztropfen an den Zitzen (1-4 Tage vor der Geburt)
- Abfall von pH-Wert: pH < 6,5 → Geburt innerhalb von 24 h

02

DIE GEBURT

ANZEICHEN DER GEBURT

- Öffnungsstadium (ca. 1-2 h): Unruhe der Stute, vermehrtes Hinlegen + Aufstehen, milde Koliksymptomatik, endet mit Abgang von Fruchtwasser
- Austreibungsstadium (5-20 min): Fohlen wird in den Fruchthüllen in den Geburtsweg gedrückt und ausgetrieben



Geburtshilfe durch vorsichtiges Ziehen, wenn das Fohlen normal liegt und:

- Austreibungsphase zu lange dauert
- Kräfte der Stute nachlassen
- Fohlen groß ist, aber normal liegt

IM NOTFALL: TIERARZT RUFEN

- 10-15 Minuten nach Abgang von Fruchtwasser **keine Fruchteile aus Vulva** sichtbar oder im Geburtsweg fühlbar
- **Rote Fruchthüllen** statt weiß-bläulichen Fruchthüllen aus Vulva sichtbar → Red Bag! Sofort eröffnen, **Erstickungsgefahr für das Fohlen**
- Hinterbeine zuerst, Vorderhufe mit Unterfläche nach oben zeigend, Kopf oder eine/beide Gliedmaße/n des Fohlens sind nicht in Geburtsweg eingetreten → **Schweregeburt**

BENÖTIGTE UTENSILIEN ZUR ERSTVERSORGUNG DES FOHLENS

- Klistier
- saubere Nabelklemmen
- Nabeldip-Desinfektion
- Nuckelflasche
- Refraktometer (Bestimmung der Kolostrumqualität)
- Geburtsstricke & Griffe
- Handschuhe

03

NACH DER GEBURT

NACHSORGE STUTE

- Nachgeburt hochbinden (Abreißen verhindern)
- **Nachgeburtsabgang nach spätestens 2 h, wenn > 2h = NOTFALL: tierärztliche Versorgung!**
- Überprüfung der Nachgeburt auf Vollständigkeit
- Überprüfung der Vulva (Geburtsverletzungen)
- Überprüfung des ausreichenden Vorhandenseins und der Qualität des Kolostrums (> 20 % BRIX)

NACHSORGE FOHLEN

- Nabelschnur nicht durchreißen!
- sofort nach Ruptur der Nabelschnur: Nabeldesinfektion, 1.-3. Lebensstag mind. 1 x täglich Desinfektion
- nach spätestens 1-2 h: Aufstehhilfe
- **nach spätestens 2 h Eingabe von Kolostrum per Flasche, wenn das Fohlen bis dahin noch nicht selbstständig am Euter trinkt**
- prophylaktische Verabreichung eines Klistiers (bei Hengstfohlen in jedem Fall empfohlen)



Außerdem zu beachten:

- Aufeutern deutlich vor dem Geburtstermin = Hinweis auf Störung!
- bei Stuten, die die Milch bereits Tage vor der Geburt laufen lassen: zusätzliche Kolostrumgabe notwendig, evtl. auch eine Plasmatransfusion
- 12-24 h (optimal 18 h) nach der Geburt Kontrolle des IgG-Wertes (Antikörperversorgung) des Fohlens über Blutprobe empfohlen



Tierärztliche Praxis Ottersberg

Durchwahl Pferdepraxis:

04205 - 31 79 19 10

Euer Anruf wird im Notdienst auf unsere Notfall-Nummer umgeleitet!